

化学療法レジメン登録書

承認日 平成 28 年 1 月 25 日  
 担当科 外科  
 責任医師名 横山 忠明

プロトコール名 SOX+Bevacizumab 療法  
 登録 No : C18-27  
 対象疾患 治癒切除不能進行再発大腸癌

使用薬剤および投与スケジュール

薬剤名	d 1	d 8	d 15	d21
① 生食 100ml アロキシ 1V デカドロン 9.9mg (d.i.v.30 分)	↓			
② アバスチン 7.5mg/kg 生食 100ml 初回 d.i.v.90 分 2 回目 d.i.v.60 分 3 回目以降 d.i.v.30	↓			
③ エルプラット 130mg/m <sup>2</sup> 5%Glu250ml (d.i.v.2 時間)	↓			
④ 生食 50ml フラッシュ	↓			
⑤ ティーエスワン 2×1 (p.o.) 下記の投与量参照	→			

21 日間毎を繰り返す

ティーエスワン d1 夕食後から d15 朝食後まで 14 日間連日内服し、その後 7 日間休薬  
 <ティーエスワン投与量>

体表面積	1 回用量
1.25 m <sup>2</sup> 未満	40mg
1.25 m <sup>2</sup> 以上 1.5 m <sup>2</sup> 未満	50mg
1.5 m <sup>2</sup> 以上	60mg

文献 : Leucovorin, fluorouracil, and oxaliplatin plus bevacizumab versus S-1 and oxaliplatin plus bevacizumab in patients with metastatic colorectal cancer (SOFT): an open-label, non-inferiority, randomised phase 3 trial. The Lancet  
Published online November 11,2013