

化学療法レジメン登録書

承認日 平成 29 年 10 月 30 日 ※令和 2 年 12 月 14 日改訂
 担当科 外科
 責任医師名 横山 忠明

プロトコール名 FOLFIRI+Ramucirumab 療法
 登録 No : C18-28
 対象疾患 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

使用薬剤および投与スケジュール

薬剤名	d 1	d 8	d14
① 生食 100ml アロキシ 1V デカドロン 6.6mg ポララミン 5mg (d.i.v.30 分)	↓		
② 生食 50ml (d.i.v.5 分)	↓		
③ サイラムザ 8mg/kg 生食 250ml ※初回 d.i.v.60 分、2 回目以降 d.i.v.30 分 蛋白質透過型のフィルター使用	↓		
④ 生食 50ml (d.i.v.5 分)	↓		
⑤ アイソボリン 200mg/m ² 5%Glu250ml (d.i.v.2 時間)	↓		
⑥ カンプト 150mg/m ² 5%Glu250ml (d.i.v.2 時間)	↓		
⑤、⑥同時投与			
⑦ 5FU400mg/m ² 生食 50ml (d.i.v.5 分)	↓		
⑧ 5FU2400mg/m ² ※生食適量 (c.i.v.46 時間)	↓		
14 日間毎			

文献 : Ramucirumab versus placebo in combination with second-line FOLFIRI in patients with metastatic colorectal carcinoma that progressed during or after first-line therapy with bevacizumab,oxaliplatin,and a fluoropyrimidine(RAISE):a randomized,double-blind,multicentre,phase 3 study