

化学療法レジメン登録書

承認日 令和5年11月27日
 担当科 外科
 責任医師名 横山 忠明

プロトコール名 CapeOX+Nivolumab 療法
 登録No: C16-25
 対象疾患 HER2 陰性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌

使用薬剤および投与スケジュール

| 薬剤名 | d 1 | d 8 | d 15 | d21 |
|--|-----|-----|------|-----|
| ① 生食プライミング | ↓ | | | |
| ② オプジーボ 360mg 生食 100ml (d.i.v.30分) インラインフィルター使用 | ↓ | | | |
| ③ 生食 50ml フラッシュ | ↓ | | | |
| ④ デカドロン 6.6mg グラニセトロン 3mg 生食 100ml (d.i.v.30分) | ↓ | | | |
| ⑤ エルプラット 130mg/m ² 5%Glu250ml (d.i.v.2時間) | ↓ | | | |
| ⑥ 生食 50ml フラッシュ | ↓ | | | |
| ⑦ ゼロータ 2×1 (p.o.) 右記の投与量参照 | → | | | |

<ゼロータ投与量>

| 体表面積 | 1回用量 |
|---|--------|
| 1.36 m ² 未満 | 1200mg |
| 1.36 m ² 以上 1.66 m ² 未満 | 1500mg |
| 1.66 m ² 以上 1.96 m ² 未満 | 1800mg |
| 1.96 m ² 以上 | 2100mg |

21日間毎を繰り返す

ゼロータ d1 夕食後から d15 朝食後まで 14日間連日内服し、その後7日間休薬