

化学療法レジメン登録書

承認日 令和6年4月8日  
 担当科 外科  
 責任医師名 横山 忠明

プロトコール名 術前 Pembrolizumab+AC 療法  
 登録 No : C50-30  
 対象疾患 ホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性で再発高リスク乳癌

使用薬剤および投与スケジュール

薬剤名	d1	d8	d15	d21
① 生食 100ml (プライミング用)	↓			
② キイトルーダ 200mg 生食 50ml (d.i.v..30分) インラインフィルター使用	↓			
③ 生食 50ml (フラッシュ用)	↓			
④ デカドロロン 9.9mg パロノセトロン 0.75mg アロカリス 235mg 生食 100ml (d.i.v.30分)	↓			
⑤ アドリアシン 60mg/m <sup>2</sup> 生食 50ml (d.i.v.15分)	↓			
⑥ エンドキサン 600mg/m <sup>2</sup> 生食 100ml (d.i.v.30分)	↓			
⑦ 生食 50ml (フラッシュ用)	↓			

21 日間毎 4 コース

術前薬物療法として PEMB+PTX+CBDCA 療法を 4 コース、PEMB+AC 療法を 4 コース投与し、術後薬物療法として PEMB200mg3 週毎を 9 コースまたは PEMB400mg6 週毎を 5 コースまで投与する。

根拠文献 : Schmid P et al. N Engl J Med 2020; 382 : 810-821

Schmid P et al. N Engl J Med 2022 ; 386 : 556-567