

化学療法レジメン登録書

承認日 令和6年9月9日
 担当科 外科
 責任医師名 横山 忠明

プロトコール名 CapeOX+Zolbetuximab 療法
 登録No: C16-27
 対象疾患 CLDN18.2 陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌

使用薬剤および投与スケジュール

薬剤名	d 1	d 8	d 15	d 21
① 生食プライミング	↓			
② パロノセトロン 0.75mg アロカリス 235mg デカドロン 9.9mg ポララミン 5mg 生食 100ml (d. i. v. 30 分)	↓			
③ ビロイ 【初回】 800mg/m ² 【2回目以降】 600 mg/m ² 注射用水適量 生食適量 インラインフィルター使用 投与速度は別紙参照	↓			
④ 生食 50ml フラッシュ	↓			
⑤ エルプラット 130mg/m ² 5%Glu250ml (d. i. v. 2 時間)	↓			
⑥ 生食 50ml フラッシュ	↓			
⑦ ゼローダ 2×1 (p. o.) 右記の投与量参照	→			

<ゼローダ投与量>

体表面積	1 回用量
1. 36 m ² 未満	1200mg
1. 36 m ² 以上 1. 66 m ² 未満	1500mg
1. 66 m ² 以上 1. 96 m ² 未満	1800mg
1. 96 m ² 以上	2100mg

21 日間毎を繰り返す

ゼローダ d1 夕食後から d15 朝食後まで 14 日間連日内服し、その後 7 日間休薬

文献: SPOTLIGHT 試験、GLOW 試験